

Amanita phalloides var. *alba*

Costantin & L.M. Dufour, *Nouv. Fl. Champ.*, Edn 2 (Paris): 256 (1895)



Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado

Eslovenia, Novo Mesto, 33T WL007626, 653 m, en bosque de abeto rojo (*Picea abies*), 19-IX-2007, leg. Miguel Á. Ribes, MAR190907-25

Descripción macroscópica

Basidiomas con píleos hasta de 12 cm, campanulado, hemisférico, luego convexo y al final plano, con cutícula sericea de color blanco puro. Láminas blancas y libres. Estípite cilíndrico, algo atenuado en el ápice, también de color blanco sericeo, pero conservando las cebraduras típicas de la especie, anillo alto y frágil y volva membranosa. Carne blanca, de olor y sabor agradable.

Descripción microscópica

No hay diferencias con la variedad tipo

Observaciones

Esta variedad blanca de *Amanita phalloides* puede confundirse fácilmente con *A. verna*, que crece en primavera y principios de verano, normalmente bajo *Quercus* y *Populus*, en terreno arenoso, con el píleo ligeramente aplanado en el disco central y con el estípite sin las cebraduras típicas de *A. phalloides*, que conserva también esta variedad.

Otras descripciones y fotografías

- AAVV. Lámina nº 902 de Bolets de Catalunya.
- GALLI, T. (2001). *Le Amanite*. Edinatura. Pág. 195
- LA CHIUSSA, L. (2000). Amanite bianche tossiche. *Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola* 43(2): 105-116.
- LLAMAS, B. & TERRÓN, B. (2003). *Atlas fotográfico de los hongos de la Península Ibérica*. Celarayn Editorial. Pág. 341
- NEVILLE, P. & S. POUMARAT. (2004). *Amaniteae. Amanita, Limacella & Torrendia*. En *Fungi Europaei* 9. Edizioni Candusso. Pág. 567