

Melanogaster tuberiformis Corda, in Sturm, *Deutschl. Fl.*, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) 3 (1831)



Corología

Registro/Herbario:

MAR 310307 41

Leg.: Justo Muñoz, Celestino Gelpi, Carlos Tovar, Manuel Luque, Fermín Pancorbo, José Cuesta, Juanjo Gómez, Marcelino Díaz, Miguel Á. Ribes
Det.: Justo Muñoz

Fecha:

31/03/2007

Lugar:

Cañamero (Cáceres)
610 m. 30S TJ9461

Hábitat:

Dehesa de alcornocal
(*Quercus suber*)


Taxonomía

- **Basiónimo:** [Melanogaster tuberiformis Corda](#), in Sturm, *Deutschl. Fl.*, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) 3 (1831)
- **Citas en listas publicadas:** Saccardo's Syll. fung. VII: 166; XII: 993; XX: 47, 1270
- **Posición en la clasificación:** Paxillaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi
- **Sinonimia:**
 - [Hyperhiza tuberiformis \(Corda\) Kuntze](#), *Revis. gen. pl. (Leipzig)* 3: 486 (1898)

Descripción macro

Hongo hipógeo, con carpóforo de forma subglobosa o alargada-elipsoidal o reniforme, bastante regular, de consistencia dura, de 2 a 5 cm, con algunos rizomorfos basales. Peridio opaco, un poco tomentoso, de color marrón-rojizo, bayo. Gleba opaca, gelatinosa, brillante, negruzca en la madurez, con una trama delgada blanco-amarillenta. Olor muy característico cuando está seco, como fenólico.

Descripción micro



1. Esporas de ovoides a elipsoidales, con una base truncada y con una papila formada por dos espículas y un ápice opuesto redondeado, de paredes gruesas, marrones, lisas, con una gran gútula central. No se han observado basidios.

Medidas esporales (1000x, material fresco)

7.8 [9.6 ; 10.3] 12.1 x 5.4 [6.3 ; 6.6] 7.4

Q = 1.3 [1.5 ; 1.6] 1.8 ; N = 35 ; C = 95%

Me = 9.94 x 6.44 ; Qe = 1.54

Otras Descripciones y Fotos

- *MONTECCHI A. & SARASINI M. Funghi ipogei d'Europe (2000). Pag. 355.*

